

# 38 Garcilla cangrejera



Garcilla cangrejera. Adulto (26-VII).

## GARCILLA CANGREJERA (*Ardeola ralloides*)

### IDENTIFICACIÓN

44-47 cm. En plumaje **nupcial** con un moño largo y colgante; dorso de color leonado; alas, obispillo y cola blancos; cabeza y cuello finamente listados de pardo. En plumaje **no nupcial** con colores más apagados y moño reducido.

### ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** parecidos al **adulto**, pero con plumas de la cabeza y cuello más cortas y claras, estriadas de marrón oscuro; manto y escapulares marrón apagado; plumas de la cola ligeramente moteadas de marrón; secundarias internas marrones; raquis de las primarias marrones; primarias externas teñidas de ocre en las barbas externas y alcanzando las puntas; coberteras del ala moteadas de marrón; pico amarillento.

**2º año** con la mayor parte del moteado marrón de las alas y cola perdidos por el desgaste, pero con las primarias **juveniles** con raquis marrón y moteadas de marrón en las puntas.

**Adulto** con plumas largas (más de 140 mm) en la cabeza y cuello, estriadas de marrón negro; manto y escapulares rosa-ante, con tinte vinoso; plumas de la cola blancas; secundarias internas y coberteras de la lavadas de ante dorado; primarias blancas; pico azulado.

### SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño puede ser de ayuda en ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 230 mm, pico con longitud mayor de 66 mm; **hembra** con ala pico con longitud menor de 66 mm (**CUIDADO:** los ejemplares con ala menor de 230 mm pueden pertenecer a cualquiera de los dos sexos).

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele terminarse en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando sólo las plumas del cuerpo; comienza en las zonas de cría y termina en las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** donde adquieren el plumaje de cortejo y cambian también algunas coberteras alares y secundarias internas.

### FENOLOGÍA


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Estival, con aves reproductoras muy escasas en puntos del río Ebro y Sariñena.



Garcilla cangrejera. Adulto: diseño de la cabeza (26-VII).



Garcilla cangrejera. Adulto: diseño del capirote (26-VII).


# 38 Garcilla cangrejera




Garcilla cangrejera. Adulto: diseño de la nuca (26-VII).



Garcilla cangrejera. Adulto: diseño del ala (26-VII).



Garcilla cangrejera. Adulto: diseño del pecho (26-VII).



Garcilla cangrejera. Adulto: diseño del dorso (26-VII).



Garcilla cangrejera. Adulto: diseño de la cola (26-VII).